


**Hvordan kan rekvireringsrett for farmasøyer bedre vaksinedekningen i Norge?
Vil Norge følge i fotsporene til en rekke andre europeiske land?**

Birgitte Lloyd

Leder i Norges Farmaceutiske Forening

Farmasidagene 9.November 2023



1

WHO:

«Det mest kostnadseffektive medisinske tiltaket vi har i dag»



FNS BÆREKRAFTSMÅL NUMMER 3:

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder



2

HVORFOR

- reduserte sykdomssymptomer
- redusert press på helsevesenet
- reduserte sykdomskostnader
- redusert antibiotika-bruk
- samfunnsberedskap



3

Anbefalte vaksiner fra FHI

Barnevaksinasjonsprogram

Sesonginfluensa
Risikogrupper, 65 år < og sykehjemsboere

Covid-19
Risikogrupper, 65 år < og sykehjemsboere

Pneumokokk
Risikogrupper og 65 år <

Boosterdose (10 år) Difteri, Kikhoste, Stivkrampe, Polio

MMR - Meslinger




4

Vaksinasjon i EU

Sverige	Danmark	Frankrike	Portugal	Irland
<p>Influenza</p> <p>Covid-19</p> <p>Pneumokokk - anbefalt til risikogrupper (gratis) og fra 65 år.</p> <p>75 år <gratis</p>	<p>Influenza - anbefalt til risikogrupper og 65 år< (gratis)</p> <p>Covid-19</p> <p>Pneumokokk - definerte risikogrupper</p>	<p>Helse-myndighetene har definert en vaksinasjons-plan/årskalender</p> <p>Fornyes/endres ved behov</p>	<p>Influenza - anbefalt til 65 år< (gratis)</p> <p>Covid - 19</p> <p>Pneumokokk - anbefalt til risikogrupper og fra 65 år (gratis)</p>	<p>Influenza - anbefalt til risikogrupper og 65 år< (gratis)</p> <p>Covid-19</p> <p>Pneumokokk - anbefalt til risikogrupper og fra 65 år (gratis)</p>
				
Apotek: samarbeider med private legeinstitusjoner	Apotek: administrerer enkelte vaksiner	Apotek: kan utleveres og administreres av farmasøyt	Apotek: kan utleveres og administreres av farmasøyt	Apotek: kan utleveres og administreres av farmasøyt

WWW.VACCINATION-INFO.EUROPA.EU

5

Eksempel på retningslinjer - USA

Table 1 See Addendum for new or updated ACIP vaccine recommendations
Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2023

Vaccine	19–26 years	27–49 years	50–64 years	≥65 years
COVID-19	2- or 3- dose primary series and booster (See Notes)			
Influenza inactivated (IIV4) or Influenza recombinant (RIV4)	1 dose annually			
Influenza live, attenuated (LAIV4)	1 dose annually			
Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap or Td)	1 dose Tdap each pregnancy; 1 dose Td/Tdap for wound management (see notes)			
Measles, mumps, rubella (MMR)	1 dose Tdap, then Td or Tdap booster every 10 years			For healthcare personnel, see notes
Varicella (VAR)	2 doses (if born in 1980 or later)		2 doses	
Zoster recombinant (RZV)	2 doses for immunocompromising conditions (see notes)		2 doses	
Human papillomavirus (HPV)	2 or 3 doses depending on age at initial vaccination or condition	27 through 45 years		
Pneumococcal (PCV15, PCV20, PPSV23)	1 dose PCV15 followed by PPSV23 OR 1 dose PCV20 (see notes)			See Notes
Hepatitis A (HepA)	2, 3, or 4 doses depending on vaccine			
Hepatitis B (HepB)	2, 3, or 4 doses depending on vaccine or condition			
Meningococcal A, C, W, Y	1 or 2 doses depending on indication, see notes for booster recommendations			

6

APOTEK OG APOTEKFARMASØYTENES ROLLE

Lavterskel-tilbud

Profesjonsnøytrale takster

36 vaksiner

Voksenvaksinasjonsprogram?

3150 vaksinatører


Se til Frankrike!

Helsepersonell

Bransjestandard



7



Tusen takk

Birgitte Lloyd

leder@farmaceutene.no

www.farmaceutene.no

8